

EXPERT PROTOCOL · REGENERATIVE PEPTIDE

STARTER PACK

BPC-157

Body Protection Compound-157 · Пробный флакон 5 мг

Высокоэффективный регуляторный пептид для ускоренного заживления тканей. Стимулирует ангиогенез и миграцию клеток к очагу повреждения. Идеальный формат для оценки переносимости и первичного отклика.

01 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

BPC-157 (Body Protection Compound-157) — регуляторный пептид, ускоряющий процессы естественного заживления тканей. Действует как **сигнальная молекула**, стимулируя образование новых сосудов (ангиогенез) и миграцию клеток к очагу повреждения.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОБНОГО КУРСА

// 01 **Купирование болевого синдрома и воспалений** в суставах, сухожилиях и связках — травмы плеча, колена, локтя, поясницы.

// 02 **Локальное восстановление мягких тканей и кожи** после микронадрывов, растяжений или операций.

// 03 **Экспресс-помощь при воспалительных процессах ЖКТ** — восстановление слизистой желудка и кишечника после агрессивной терапии.

// **ВНИУ 5MG** **Пробный флакон 5 мг** — оптимальный формат для оценки переносимости и первичного отклика организма. Позволяет пройти **5–10 дней короткого тестового цикла** без обязательства на полноценный курс. Если результат позитивный — можно докупить виалы под нужный курс.

02 ПРАВИЛО СТАРТА · БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Пептид отдаёт команду клеткам на **форсированное заживление и деление** — организму требуется качественный белковый ресурс.

ОБЩИЙ БЕЛОК КРОВИ

// KEY MARKER

Целевой уровень в плазме — строго **> 75 г/л**.

При дефиците общего белка регенеративный отклик будет существенно снижен — эффект от пробного курса окажется слабее реального потенциала пептида.

03 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЕДЕНИЮ · ВИАЛА 5 МГ

Препарат поставляется в виде **лиофилизированного (сухого) порошка**.

// РАСТВОРИТЕЛЬ	Бактериостатическая вода из комплекта · объём 3 мл
// КОНЦЕНТРАЦИЯ	5 мг / 3 мл $\approx$ 1,67 мг/мл
// ВЕСЬ ФЛАКОН (3 МЛ)	= 5000 мкг (5 мг) действующего вещества
// 15 ЕД НА ШПРИЦЕ	= 250 мкг (микродоза)
// 30 ЕД НА ШПРИЦЕ	= 500 мкг (стандартная доза)

01 Сними пластиковый колпачок с флакона, тщательно протри резиновую пробку **спиртовой салфеткой**.

02 С помощью обычного шприца набери **3 мл бактериостатической воды**.

03 Плавнo и медленнo, по капле, введи воду во флакон, направляя струю строго **по стеклянной стенке**.

04 Аккуратнo **вращай флакон в пальцах** до полного растворения микрочастиц и достижения абсолютной прозрачности раствора.

× **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТРЯСТИ ИЛИ ВЗБАЛТЫВАТЬ ВИАЛУ.**
Только плавное вращение — тряска повреждает белковую структуру пептида.

04 СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ · 2 ПРОТОКОЛА

Инъекции выполняются подкожно инсулиновым шприцем. Препарат можно вводить как **системно** (в жировую складку на животе/боках), так и **локально** (подкожно, максимально близко к зоне боли или травмы — рядом с суставом, сухожилием, поясницей).

× **ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.**
Только подкожно — в мягкие ткани максимально близко к зоне повреждения.

// TIER 01 · LITE

СХЕМА «ЛАЙТ»

 Профилактика · Мягкое восстановление ЖКТ · **1 флакон = 10 дней курса**

// РАЗОВАЯ ДОЗА

250 мкг × 2 раза

Микродоза утром + вечером

// СУТОЧНЫЙ РАСХОД

500 мкг (30 ЕД)

Общая суточная норма

// НА ШПРИЦЕ U-100

15 ЕД × 2

По 15 ЕД за один укол

// ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

10 дней

Полный расход пробного флакона

// TIER 02 · PRO

СХЕМА «ПРО»

 Рабочая схема при травмах и после операций · **1 флакон = 5 дней курса**

// РАЗОВАЯ ДОЗА

500 мкг × 2 раза

Стандартная доза утром + вечером

// СУТОЧНЫЙ РАСХОД

1000 мкг (1 мг)

60 ЕД за сутки

// ПОЧЕМУ 2 РАЗА

Короткий T½

Ровный фон в течение суток

// НА ШПРИЦЕ U-100

30 ЕД × 2

По 30 ЕД за один укол

// ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

5 дней

Полный расход пробного флакона

// ТАЙМИНГ

Утро + вечер

С равным интервалом ~12 часов

ПОЛНОЦЕННЫЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ КУРС

// SCALING

Для полноценного регенеративного курса **4–8 недель** после оценки переносимости на пробном флаконе **докупается необходимое количество виал** из расчёта суточного расхода.

По ЛАЙТ: 4 недели = 3 виалы · 8 недель = 6 виал.

По ПРО: 4 недели = 6 виал · 8 недель = 12 виал.

05 РАСХОДНИКИ НА ПРОБНЫЙ КУРС

#	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	НАЗНАЧЕНИЕ
01	Виала BPC-157 (5 мг)	1 шт	Пробный флакон
02	Бактериостатическая вода (3 мл)	1 амп	В комплекте с флаконом

#	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ - ВО	НАЗНАЧЕНИЕ
03	Шприц обычный двухкомпонентный, 3–5 мл	1 шт	Для разведения флакона
04	Спиртовые салфетки	15–25 шт	Обработка пробки и кожи
05	Инсулиновые шприцы U-100 · 1 мл Иглы 29G–31G · длина 6–8 мм · впаянные	20 шт ЛАЙТ: 20 · ПРО: 10	Ежедневные п/к инъекции

06 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СИНЕРГИЯ И ХРАНЕНИЕ

ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ

// COMFORT

Препарат нейтрален — укол проходит **абсолютно безболезненно**.

Нет: жжения, покалывания, синяков (в отличие от пептидов меди).

Есть: совместимость с **Тирзепатидом** или **Ретатрутидом** без конфликтов.

// SYNERGY BPC-157 **идеально сочетается с GLP-1** (Тирзепатид/Ретатрутид) — защищает слизистую ЖКТ от возможных побочных глутидов и параллельно решает задачи регенерации. Курс похудения + защита ЖКТ одновременно.

✗ ОНКО-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Поскольку пептид стимулирует ангиогенез (рост капилляров), применение **строго противопоказано** при наличии любых активных онкологических процессов в организме.

ХРАНЕНИЕ

ПОРОШОК · ЛИОФИЛИЗАТ // STATE 01

Тёмный шкаф, комнатная температура:
до 1 года

Морозильная камера:
годами без потери активности

РАСТВОР · ЖИДКИЙ // STATE 02

СТРОГО в холодильнике
при **+2...+8°C**

Срок стабильности:
до 3 месяцев (на бак. воде)

❄ ЗАМОРАЖИВАНИЕ РАЗВЕДЁННОГО РАСТВОРА ЗАПРЕЩЕНО.

Кристаллизация воды разрушает белковую структуру пептида. Восстановлению не подлежит.