

EXPERT PROTOCOL · ФРАГМЕНТ α -MSH · ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

KPV

Lys-Pro-Val · Трипептид · Флакон 5 мг

Короткий противовоспалительный пептид для ЖКТ и кожи. Применяется как сопутствующая нутрицевтическая поддержка для регенерации слизистых оболочек ЖКТ и снижения локального гистаминного ответа кожи. Часто стэкается с BPC-157. Не заменяет назначенную терапию и не купирует острые аллергические реакции (при анафилаксии — адреналин и врач).

01 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

KPV (Lys-Pro-Val) — концевой трипептидный фрагмент гормона α -MSH (альфа-меланоцит-стимулирующий гормон, остатки 11–13). Обладает выраженным **противовоспалительным** действием: подавляет активацию провоспалительного каскада (NF- κ B) в клетках слизистой и кожи, снижая продукцию медиаторов воспаления. В отличие от полноразмерного α -MSH, **не стимулирует пигментацию** — загара не даёт. Статус — research.

// НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖКТ

СРК, воспаления кишечника — часто в стеке с BPC-157

КОЖА

Крапивница, воспалительные и аллергические реакции кожи

КОЖА+

Снижение локального гистаминного ответа, поддержка при раздражении кожи

= Работает как «тушитель» воспаления — там, где избыточен иммунный ответ слизистой и кожи

// EFFECT 01 · ЖКТ

Успокоение воспаления кишечника

Снижает воспалительную активность слизистой при СРК и раздражении кишечника; синергичен с BPC-157 по восстановлению ЖКТ.

// EFFECT 02 · КОЖА И АЛЛЕРГИЯ

Противоаллергический и кожный эффект

Уменьшает проявления крапивницы, кожных воспалений и реакций пищевой аллергии за счёт торможения воспалительного каскада.

02 РАЗВЕДЕНИЕ · ВИАЛА 5 МГ

Обработать пробку спиртовой салфеткой. Набрать **2 мл** воды, ввести по стенке флакона. **НЕ ТРЯСТИ** — плавно вращать до полного растворения. Раствор должен быть прозрачным; помутнение = не использовать.

РАСТВОРИТЕЛЬ Бактериостатическая вода · объём 2 мл

КОНЦЕНТРАЦИЯ 5 мг / 2 мл = 2,5 мг/мл (шкала U-100)

10 ДЕЛЕНИЙ = 0,25 МГ 250 мкг — базовый шаг дозирования

03 ДОЗИРОВКИ

КАТЕГОРИЯ	РАЗОВАЯ ДОЗА	ЧАСТОТА	ДЕЛЕНИЙ U-100
Старт / чувствительные	200 мкг	1–2 раза в день	8
Рабочая (максимум)	500 мкг	1–2 раза в день	20

Диапазон по протоколу — **200–500 мкг подкожно, 1–2 раза в день**. Начинать с нижней дозы, оценивая переносимость. Курс — **15–30 дней**.

04 СХЕМА И ЧАСТОТА

п/к

путь введения — подкожно

1–2×/день

частота инъекций

15–30 дн

длительность курса

+ СТЕК С ВРС-157.

При проблемах с кишечником и крапивнице KPV часто сочетают с ВРС-157 для усиления восстановительного и противовоспалительного эффекта.

05 БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Не применять при беременности и грудном вскармливании. Не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Перед применением — консультация врача.

* ХРАНЕНИЕ.

Общая рекомендация (на странице протокола не указано): порошок — тёмный шкаф; готовый раствор — +2...+8°C, не замораживать.