

EXPERT PROTOCOL · МЕЛАНКОРТИНОВЫЙ АГОНИСТ · ЗАГАР

MT-2

Melanotan-2 · Меланокортиновый пептид · Флакон 5 мг

Синтетический аналог α-меланоцитстимулирующего гормона. Полифункциональное действие за счёт стимуляции разных меланокортиновых рецепторов: загар и защита кожи от УФ, снижение аппетита, усиление либидо.

01 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

ЗАГАР

Активирует меланоциты → синтез меланина. Снижает риск ожога, но НЕ заменяет SPF

АППЕТИТ

Действие на гипоталамус → снижение аппетита, контроль веса

ЛИБИДО

Центральная стимуляция ЦНС → влечение и половая функция у мужчин и женщин

02 РАЗВЕДЕНИЕ · ВИАЛА 5 МГ

Снять крышку, протереть пробку спиртовой салфеткой. Набрать **2 мл** воды, медленно ввести по стеклянной стенке в сухой порошок. **НЕ ТРАСТИ** — плавно вращать в пальцах до абсолютной прозрачности раствора.

РАСТВОРИТЕЛЬ Бактериостатическая вода · ровно 2 мл

КОНЦЕНТРАЦИЯ 5 мг / 2 мл = 2,5 мг/мл (200 ЕД в вiale)

10 ДЕЛЕНИЙ = 250 МКГ 0,25 мг в 0,1 мл

4 ЕД = 100 МКГ · 8 базовые шаги дозирования
ЕД = 200 МКГ

03 СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПО ФАЗАМ

Подкожно инсулиновым шприцем в жировую складку (живот, бока). Протокол оптимизирован для ровного и безопасного загара — против ошибочных «ударных» доз, дающих гиперпигментацию.

ФАЗА	ДНИ	ДОЗА	НАБОР U-100	ЧАСТОТА
1 · Адаптация	1–3	100–200 мкг	4–8 ЕД	ежедневно, перед сном
2 · Накопление	с 4-го	200–300 мкг	8–12 ЕД	ежедневно, перед сном
3 · Поддержание	после цели	300–500 мкг	12–20 ЕД	1–2 раза в неделю

// ФАЗА 2 · ИНСОЛЯЦИЯ

Умеренное солнце для проявления пигмента

Для ускорения загара — сеансы инсоляции (солнце или солярий) по 10–15 минут раз в 2–3 дня. Фаза 3 — доза за приём перед выходом на солнце.

04 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

! ТОШНОТА И ПРИЛИВЫ ЖАРА НА СТАРТЕ.

Возможны в первые 30–60 минут после укола. Именно поэтому инъекции ставятся строго перед сном — пик дискомфорта проходит во сне.

× НЕ ЗАМЕНЯЕТ SPF · КОНТРОЛЬ РОДИНОК.

Препарат снижает риск ожогов, но не отменяет солнцезащитные средства (SPF) и дозированное солнце. До курса — картирование родинок, во время и после — дерматологический контроль. Любое изменение размера, цвета или формы невуса, новый быстрорастущий элемент → немедленно к врачу и отмена.

! ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА И ЛИБИДО.

Возможно временное потемнение родинок и микро-веснушки, а также спонтанная эрекция / рост либидо — центральный эффект стимуляции рецепторов. Изменения невусов не игнорировать (см. выше).

× ПРОТИВПОКАЗАНО ПРИ ОНКОЛОГИИ.

При наличии активных онкопроцессов пептид строго противопоказан — меланокортиновая стимуляция усиливает пролиферацию.

05 ХРАНЕНИЕ

ПОРОШОК тёмный шкаф до 1 года; морозильник до 3 лет

РАСТВОР строго +2...+8°C, стабилен 2–3 месяца, не замораживать