

NEURO STACK · КОГНИЦИЯ + СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ · П/К

СЕМАКС + СЕЛАНК

Нейрорегуляторный стек · Два флакона по 10 мг

Интегративный протокол: одновременное улучшение когнитивных функций (память, фокус, обучаемость) и стабилизация психоэмоционального баланса (тревожность, стрессоустойчивость).

Инъекционная форма даёт биодоступность 90–100% против 20–50% у назального спрея — действие ровнее, стабильнее и дольше.

01 ХАРАКТЕРИСТИКА И БИОДОСТУПНОСТЬ

СЕМАКС

Ноотроп: энергия, ясность, концентрация. Утренний блок

СЕЛАНК

Анксиолитик: спокойствие, сон, восстановление. Вечерний блок

90–100%

биодоступность п/к против 20–50% у назального спрея

// ПОЧЕМУ ПОДКОЖНО

Ровное и длительное действие

Селанк: п/к даёт 90–100% биодоступности против 20–50% у спрея. Семакс: п/к исключает раздражение слизистой носа, действие пролонгированное за счёт постепенного высвобождения.

02 РАЗВЕДЕНИЕ · ВИАЛЫ ПО 10 МГ

Снять крышки, протереть пробки спиртовой салфеткой. Медленно по стенке ввести **по 2 мл** бак. воды в **каждую** виалу. Плавное вращать до полного растворения — раствор должен быть кристально прозрачным.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Бактериостатическая вода · по 2 мл на каждый флакон

КОНЦЕНТРАЦИЯ

10 мг / 2 мл = 5 мг/мл (200 ЕД в виале)

10 ДЕЛЕНИЙ = 500 МКГ

0,5 мг в 0,1 мл

6 ДЕЛЕНИЙ = 300 МКГ

рабочая суточная доза каждого пептида

03 СХЕМА И ДОЗИРОВАНИЕ

БЛОК	ПЕПТИД	СУТОЧНАЯ ДОЗА	НАБОР U-100	ТАЙМИНГ
☀ Утро	Семакс	300 мкг	6 ЕД	после пробуждения
🌙 Вечер	Селанк	300 мкг	6 ЕД	перед сном

// СЕМАКС • УТРЕННИЙ БЛОК

300 мкг = 6 делений, 1 раз в день утром

Строго в первой половине дня: Семакс повышает ясность и бодрит, поздний укол мешает засыпанию.

// СЕЛАНК • ВЕЧЕРНИЙ БЛОК

300 мкг = 6 делений, 1 раз в день вечером

Перед сном: нормализует фазы сна, снимает накопленный за день стресс, восстанавливает нервную систему.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 4–6 недель непрерывно (~33 дня)

РАСХОД по 1 флакону каждого хватает ровно на 33 дня

ПЕРЕРЫВ 1–2 месяца между курсами

04 ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

✳ ХРАНЕНИЕ.

Порошок — тёмный шкаф до 1 года. Готовый раствор — строго +2...+8°C не более 2–3 месяцев. Замораживать раствор категорически запрещено.

✓ ТЕХНИКА ИНЪЕКЦИЙ.

Препараты нейтральны по pH, безболезненны, без жжения и зуда. П/к в жировую складку (живот, бока), шприц U-100 с впаянной иглой 6–8 мм. Чередовать точки введения ежедневно.