

EXPERT PROTOCOL · DUAL AGONIST · GLP-1 / GIP · MONTHLY VIAL

TIRZEPATIDE

Тирзепатид · Двойной агонист · Флакон 10 мг · Стандарт 10 мг/мл

Двухкомпонентный полипептидный агонист рецепторов GLP-1 и GIP. Единый стандарт концентрации 10 мг/мл для всей линейки. Один флакон рассчитан на 4 недели базового рабочего режима терапии.

01 ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Tirzepatide (Тирзепатид) — инновационный **двухкомпонентный полипептидный агонист** рецепторов GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1) и GIP (глюкозозависимого инсулиотропного полипептида).

// ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СРЕДИ GLP-1 ПЕПТИДОВ

СЕМАГЛУТИД

1 рецептор
GLP-1
Классика · Мягкий

ТИРЗЕПАТИД

2 рецептора
GLP-1 + GIP
Оптимум · Мощный

РЕТАТРУТИД

3 рецептора
GLP-1 + GIP + GCG
Максимальный

Тирзепатид — золотая середина: мощнее Семаглутида, мягче Ретатрутида

// ЭФФЕКТ 01 · ГЛИКЕМИЯ

Выраженный контроль сахара крови

Активация GIP + GLP-1 обеспечивает мощный гликемический контроль через глюкозо-зависимую секрецию инсулина без риска гипогликемии.

// ЭФФЕКТ 02 · ПИЩЕВОЙ ШУМ

Подавление аппетита на уровне ЦНС

Устраняет «пищевой шум» на уровне центральной нервной системы. Замедляет эвакуацию пищи из желудка — быстрое и стойкое насыщение малыми порциями.

// ЭФФЕКТ 03 · ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Восстановление чувствительности к инсулину

Активация GIP-рецепторов улучшает чувствительность тканей к инсулину и оптимизирует утилизацию глюкозы клетками.

02 ПРАВИЛО СТАРТА · ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕКАП

Перед началом курса рекомендуется сдать **базовые анализы** и пройти обследования для исключения прямых противопоказаний.

// ЧЕКАП 01 · КРОВЬ

Анализы крови

ОАК — общий анализ

Общий белок — **> 75 г/л**

(защита от потери мышц и обвисания кожи)

Амилаза, Липаза — поджелудочная

(противопоказано при активном панкреатите)

// ЧЕКАП 02 · ОНКОМАРКЕР

Щитовидная железа

Кальцитонин — онкомаркер для исключения медуллярного рака щитовидной железы

Обязательный маркер перед стартом любого GLP-1 препарата.

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

// UZI

Обязательно: исключить **камни в желчном пузыре**.

Замедление моторики ЖКТ на Тирзепатиде может спровоцировать застой желчи. При наличии камней курс запрещён.

03 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЕДЕНИЮ · ВИАЛА 10 МГ

Согласованный единый стандарт концентрации для всей линейки Тирзепатида — **10 мг/мл**. Флакон 10 мг разводится строго в **1 мл** бактериостатической воды.

// РАСТВОРИТЕЛЬ

Бактериостатическая вода · объём 1 мл

// КОНЦЕНТРАЦИЯ

10 мг / 1 мл = **10 мг/мл** (весь флакон = 100 ЕД)

// 2,5 ЕД НА ШПРИЦЕ

= **0,25 мг** (микро-шаг)

// 10 ЕД НА ШПРИЦЕ

= **1,0 мг** (пробная стартовая доза)

// 12,5 ЕД НА ШПРИЦЕ

= **1,25 мг** (дробный ввод × 2 раза/нед)

// 25 ЕД НА ШПРИЦЕ

= **2,5 мг** (базовая недельная)

// 50 ЕД НА ШПРИЦЕ

= **5,0 мг** (повышенная недельная)



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ТРЯСТИ ИЛИ ВЗБАЛТЫВАТЬ ВИАЛУ.

Плавными вращательными движениями покачивай флакон до полного растворения. Готовый раствор должен быть кристально прозрачным.

04 СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ · 3 ФАЗЫ ТИТРАЦИИ

Инъекции выполняются **подкожно** инсулиновым шприцем U-100 (с впаянной иглой 6–8 мм) в жировую складку (живот или бока). Приём пищи не влияет на время укола. Первые инъекции — в первой половине дня для оценки индивидуальной реакции.

// ФАЗА 01 · АДАПТАЦИЯ · НЕДЕЛЯ 1

ПРОВЕРКА РЕЦЕПТОРОВ

Исключить гиперчувствительность к GLP-1/GIP-рецепторам · Оценить индивидуальную переносимость

// ДЕНЬ 1 · ПРОБНЫЙ УКОЛ

1,0 мг = 10 ЕД

Оценка тошноты, головокружения, реакции ЦНС

// ЦЕЛЬ ФАЗЫ

Толерантность

Убедиться в безопасности продолжения курса

// ДЕНЬ 4–5 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

1,5 мг = 15 ЕД

При отсутствии побочных эффектов

// РАСХОД

2,5 мг за неделю

25 ЕД из 100 ЕД во флаконе

// ФАЗА 02 · БАЗОВЫЙ РЕЖИМ · НЕДЕЛИ 2–4

РАБОЧАЯ ТИТРАЦИЯ

Стандартная недельная дозировка · **1 флакон = 4 недели курса** при базовой дозе 2,5 мг/нед

// ВАРИАНТ 1 · КЛАССИКА

2,5 мг × 1 раз/нед

25 ЕД в фиксированный день недели

// ЦЕЛЬ ФАЗЫ

Стабильный эффект

Ровная концентрация в плазме

// ВАРИАНТ 2 · ДРОБНЫЙ

1,25 мг × 2 раза/нед

12,5 ЕД (пн + чт) — если действие снижается к 4-му дню

// РАСХОД

10 мг за 4 недели

Ровно 1 флакон на месяц

// ФАЗА 03 · ПОВЫШЕНИЕ · ПРИ СНИЖЕНИИ ОТКЛИКА

ТИТРАЦИЯ ВВЕРХ

Переход при остановке снижения веса и возврате аппетита

// НОВАЯ ДОЗА

5,0 мг × 1 раз/нед

50 ЕД в фиксированный день недели

// РАСХОД

1 флакон = 2 недели

На месячный курс — 2 флакона

// ПОКАЗАНИЯ

Плато веса

Возврат «пищевого шума»

// СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

До 7,5–10 мг/нед

Только при отсутствии эффекта

05 БЕЗОПАСНОСТЬ · ЗАЩИТА ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Замедление моторики ЖКТ на фоне приёма GLP-1 агонистов требует соблюдения **4 обязательных правил**.

1

ЗАПРЕТ НА ПОЛНОЕ ГОЛОДАНИЕ.

Требуется регулярный приём пищи (2–3 раза в день) для механической стимуляции ЖКТ. Голодание провоцирует застой желчи и потерю мышечной массы.

2

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ В РАЦИОНЕ.

Добавляй оливковое масло, рыбу или орехи в каждый приём пищи — жиры вызывают естественное сокращение желчного пузыря и предотвращают застой желчи.

3

ВОДНЫЙ И БЕЛКОВЫЙ МИНИМУМ.

Пить не менее **2,5 литров** чистой воды в день. Нагрузка по белку — **1,5–2 г на кг идеальной массы тела** во избежание потери мышечной массы.

4

СТОП-СИГНАЛ.

При резких болях в правом подреберье или симптомах панкреатита **немедленно приостанови приём** и сделай УЗИ желчного пузыря.

// **ALCOHOL** Алкоголь — строго исключить на курсе. Замедленное пищеварение задерживает спирт в организме → тяжёлая интоксикация, вздутие, изжога и рвота даже от малых доз.

06

РАСЧЁТ РАСХОДНИКОВ · 4 НЕДЕЛИ БАЗОВОЙ СХЕМЫ

Расчёт на базовую фазу — 2,5 мг/неделю на 4 недели. Одного флакона 10 мг ровно хватает на **месячный курс**.

#	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	НАЗНАЧЕНИЕ
01	Виала Тирзепатида (10 мг)	1 шт	На 4 недели курса при 2,5 мг/нед
02	Бактериостатическая вода (1 мл)	1 амп	В комплекте с флаконом
03	Шприц обычный 2–3 мл	1 шт	Забор воды и разведение
04	Спиртовые салфетки инъекционные	6–8 шт	Обработка пробки и кожи
05	Инсулиновые шприцы U-100 · 1 мл Иглы 30G–31G · длина 6–8 мм · впаянные	4–8 шт B1: 4 · B2: 8	Еженедельные п/к инъекции

!

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО — только шприцы со ВПАЯННОЙ иглой.

В носике шприцев со съёмной иглой остаётся «мёртвая зона» — потеря до 10–15% дорогостоящего Тирзепатида при каждом уколе.

07

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Порошок · лиофилизат // STATE 01 Тёмное место, комнатная температура: до 6 месяцев Морозильная камера: до 24 месяцев	Раствор · жидкий // STATE 02 СТРОГО в холодильнике при +2...+8°C Срок стабильности: до 28 дней (согласно USP <51>)
---	--

❄

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ ГОТОВЫЙ РАСТВОР.

Кристаллизация воды разрушает белковую структуру пептида.